4. 하루에 여러 가지 백신을 동시에 접종 받아도 되나요?

하루에 여러 가지 백신을 동시에 접종하더라도 효과가 감소한다거나 이상반응이 증가하지 않습니다.

따라서 하루에 여러 가지 백신을 접종받으셔도 됩니다.

5. 백신을 접종 받으면 안 되는 경우도 있나요?

간이식을 받고 면역억제제를 복용 중인 분은 생백신을 접종받을 수 없습니다. 임신 중이거나 면역기능이 심각하게 저하되는 다른 질환이 있는 경우에도 생백신은 접종받을 수 없습니다.

예전에 백신 접종 후 심각한 이상반응이 있었던 적이 있다면 똑같은 백신은 접종받지 않아야 합니다.

현재 급성질환으로 치료 중이라면 증세가 충분히 회복된 후 백신을 접종받는 것이 좋습니다.

다만, 열이 없는 가벼운 감기가 있는 경우에는 백신 접종이 가능합니다.

6. 백신을 접종 받고 싶으시거나 상담을 원하시면 아래의 외래로 방문 해 주세요.

대한감염학회

서울시 강남구 삼성동 158-10 마젤란 21 아스테리움 1203호
TEL: 02-2055-1441/7
FAX: 02-2055-1442
Homepage: http://www.ksid.or.kr
E-mail: ksinfect@ksid.or.kr

http://www.ksid.or.kr

성인 예방 접종 안내

만성 간 질환자

5번째 백신 안내

만성 간 질환자 편

만성간질환자

예방접종하면
아기나 어린이들만
필요한 것이라 생각하시나요?
하지만 어른에게
꼭 필요한 예방접종에도
여러 종류가 있습니다.
어른에게 꼭 필요한
여러 가지 예방접종 중
만성 간 질환자 분들을 위한
예방접종에 대해
안내해 드리겠습니다.

대한감염학회

1. 만성 간 질환이 있는 사람은 왜 예방접종이 필요한가요?

만성 간 질환이 있는 분들은 면역기능이 떨어져 몇몇 감염성 질환에 걸릴 위험이 높아집니다.

또한 만성 간 질환이 있는 분들은 같은 감염성 질환에 걸리더라도 합병증이 발생할 확률이 더 높아집니다. 뿐만 아니라, 만성 간 질환이 있는 상태에서 다른 급성바이러스 간염이 발생하는 경우 간손상을 악화시켜서 치명적인 결과를 낳을 수 있습니다.
외국에서 시행된 연구 결과에 의하면 B형 간염 보균자에서 급성 바이러스성 간염이 발생하는 경우 간부전으로 진행할 확률이 6배 이상 높았다고 합니다.

따라서 만성 간 질환이 있는 분들은 이러한 감염성 질환 및 바이러스성 간염에 대한 백신을 접종 받으셔야 합니다.

2. 어떤 백신을 접종 받아야 하나요?

만성 간 질환으로 인해 중요성이 강조되는 예방접종 대상 질환에는 인플루엔자, 폐렴사슬알균 감염증, A형 간염, B형 간염 등이 있습니다.

(1) 인플루엔자

만성 간 질환이 있는 분들에게 인플루엔자가 발생하면 기존의 간 질환을 악화시킬 수 있습니다.

또한 만성 간 질환이 있는 분들은 면역기능이 떨어지기 때문에 인플루엔자가 발생한 후 폐렴 등 합병증이 발생할 위험이 높습니다.

(2) 폐렴사슬알균 감염증

만성 간 질환이 있는 분들은 건강한 성인에 비해 폐렴사슬알균 감염증이 발생할 위험이 높고 폐렴사슬알균 감염증이 발생한 경우 중증으로 진행하거나 사망에 이를 확률이 높습니다.

(3) A형 간염

만성 간 질환이 있는 분들이 A형 간염에 걸리면 전격성 간염으로 진행하거나 사망에 이를 위험이 높아집니다.

일부 연구 결과에 의하면 만성 B형 간염 환자가 급성 A형 간염에 걸리는 경우 사망률은 5.6~29배 증가한다고 합니다.

(4) B형 간염

알코올 등 다른 이유에 의한 만성 간 질환이 있는 분들이 B형 간염에 걸리면 간경화나 간암으로 진행될 위험이 더 높아집니다.

일부 연구 결과에 의하면 만성 C형 간염 환자에서 만성 B형 간염이 동반되는 경우 간경화로 더 잘 진행하고 간암 발생률도 더높아졌다고 합니다.

(5) 일반적인 권고에 따른 예방접종

만성 간 질환이 있다고 하여 중요성이 더 강조되는 것은 아니지만 파상풍-디프테리아-백일해, 홍역-볼거리-풍진, 수두, 대상포진 백신 등이 있습니다.

3. 예방접종은 안전한가요?

현재 시판되는 백신은 충분한 동물시험과 임상시험을 거쳐 개발된 것으로 사람들에게 접종하는데 안전하고 효과적이라는 것이 인정된 것들입니다.

그러나 백신의 종류와 피접종자의 상태에 따라서 주사 부위에 발진, 통증, 붓기, 가려움증 등의 증상이 발생하거나 전신적으로 두통, 근육통, 열감 등이 발생하는 경우도 있습니다.

대부분의 증상은 경미하고 일시적이나 만약 중등도 이상의 증상이 발생하는 경우 담당 의료진에게 문의하시면 적절한 조치를 받으실 수 있습니다.